

Nobivac® DHPPi

واکسن چهارگانه مخصوص سگ



- تهیه شده با بالاترین کیفیت و تکنولوژی برتر دنیا
- شروع سریع ایمنی در مدت ۷ روز
- قابل استفاده در دوران آبستنی و شیردهی



www.npb.co.ir


NIKO GENE ARYA

www.nikogene.co.ir

Nobivac® DHPPi

ترکیب واکسن: هر دز از واکسن حاوی حداقل 10^7 TCID₅₀ ویروس عامل بیماری پاروویروس سویه 154 و حداقل 10^4 TCID₅₀ ویروس عامل بیماری دیستمپر سویه Onderstepoort و حداقل 10^4 TCID₅₀ ویروس عامل بیماری آدنوویروس تیپ ۲ سویه Manhattan LPV3 و حداقل $10^{5.5}$ TCID₅₀ ویروس عامل بیماری پارانفلوانزا سویه Cornell می‌باشد.

شکل و نوع واکسن: واکسن زنده تخفیف حدت یافته و لیوفیلیزه

مورد مصرف: واکسن چهارگانه جهت ایمن سازی فعال علیه Canine Distemper Virus، بیماری تنفسی ناشی از Canine Adenovirus type 2، Parvovirus و بیماری تنفسی ناشی از Canine Parainfluenza type 1 در سگ‌ها

دز و نحوه مصرف: ابتدا واکسن را در حلال مخصوص به خوبی حل کرده، سپس ۱ میلی لیتر واکسن Nobivac® DHPPi را به صورت زیر جلدی تزریق کنید. اولین دز تزریق واکسن در ۸-۹ هفتهگی و تزریق دوم در ۱۲ هفتهگی توصیه می‌شود.

زمان شروع ایمنی و افزایش تیتر:

- برای عفونت های CDV & CPV، یک هفته پس از تجویز
- برای عفونت CAV 2، دو هفته پس از تجویز
- برای عفونت CPi، چهار هفته پس از تجویز

ماندگاری ایمنی متعاقب با واکسیناسیون برای ویروس های با منشأ CDV, CAV2 & CPV سه سال و در عفونت با منشأ CPi، تا یک سال پس از تجویز اولیه.

توصیه ها و احتیاطات لازم:

- دقت کنید واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.
- واکسن باید طبق نظر دامپزشک مصرف شود.
- با هیچ گونه واکسن زنده و یا محصولات ایمونولوژیکی مخلوط نگردد.
- دور از دسترس کودکان، حیوانات و افراد بی اطلاع نگهداری شود.
- در صورت ورود اشتباه سرنگ به فرد تزریق کننده سریعاً محل را با آب شست و شو داده و اگر علائم خاصی بروز کرد به پزشک مراجعه شود.

موارد منع مصرف: از واکسیناسیون سگ های بیمار خودداری شود.

عوارض جانبی:

۱. ممکن است یک تورم جزئی و موقت در محل تزریق پس از واکسیناسیون رخ دهد. این تورم پس از مدتی ناپدید می‌شود.
 ۲. در موارد بسیار نادر واکنش ازدیاد حساسیت خواهد بود که بدون فوت وقت سریعاً آنتی هیستامین، کورتیکواستروئید یا آدرنالین باید تجویز شود.
 ۳. ممکن است افزایش ملایم دمای بدن و همچنین به ندرت در توله سگ‌ها کاهش فعالیت و اشتها پس از واکسیناسیون رخ دهد.
- شرایط نگهداری: در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد و دور از نور، حمل و نگهداری شود.

مدت نگهداری:

- عمر قفسه ای: ۲ سال
- زمان مناسب مصرف پس از آماده سازی واکسن: ۳۰ دقیقه

بسته بندی: بسته بندی بصورت ویال های تک دزی ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ عددی واکسن Nobivac® DHPPi محصول شرکت MSD هلند می‌باشد.

شرکت ثبت و وارد کننده انحصاری: نیکو ژن آریا



شرکت پخش سراسری نیکان پخش
نیکان پخش به آفرین

تهران، میدان توحید، خیابان امیرلو، کوچه محمدی، پلاک ۲۳، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱ - ۵۲۸۹۵
فکس: ۰۲۱ - ۶۶۹۴۲۴۹۵
www.npb.co.ir
info@npb.co.ir

NIKO GENE