


HIPRABOVS 3

Protect the future of the herd by vaccinating calves with broad spectrum Hiprabovis

واکسن کشته سه گانه بر علیه اسید ویروسی گاو (BVD)،
رینوترواکنیت عفونی گاو (IBR) و پارا انفولانزا ۳ (PI3)



The Reference
in Prevention
for Animal Health



توزيع احصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶ کد پستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۰۲۱ ۵۴ ۰۶ - ۰۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمبر: ۰۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



HIPRABOV 3

واکسن کشته سه گانه بر علیه اسهال ویروسی گاو (BVD)، رینو تراکتیت عفونی گاو (IBR) و پار انفلوانزا ۳ (PI3)

توفیک

ویروس غیر فعال BVD، IBR و PI3 همراه با ماده یاور (adjuvant) هیپرابویس ۳ واکسن سه گانه که (بعد از تجویز) اینمی فعال بر علیه ویروسهای BVD، IBR و PI3 ایجاد کرده و از سندروم تنفسی گاو و مشکلات تولید مثلی ناشی از ویروسهای BVD و IBR از جمله سقط، ناباروری، تولد گوساله های عفونی پایدار (PI) و ولوواژنیت پوسچولار (IPV) جلوگیری می کند.

موارد مصرف

گاو بالغ (گاوهای و تلیسه ها): جلوگیری از رینو تراکتیت عفونی گاو، ولوواژنیت پوسچولار عفونی و اسهال ویروسی گاو گوساله ها: جلوگیری از رینو تراکتیت عفونی گاو، پار انفلوانزا ۳ و اسهال ویروسی گاو

دزاز

گاو (گوساله، گاو و تلیسه): ۳ میلی لیتر از سن ۴ الی ۶ هفتگی در تمام اوزان و سنین

نحوه تجویز

تریک داخل عضلانی در ناحیه گردن و یا تزریق زیر جلدی در ناحیه چین های پوستی زیر گردن

برنامه واکسیناسیون

گوساله ها و گاوهای تجویز یک دز واکسن و یادآوری واکسیناسیون ۲۱-۳۰ روز بعد. تجویز واکسن مجدد به صورت سالیانه انجام می شود. (بنابر توصیه دامپزشک گله فواصل تجویز می تواند تا دوبار در سال کاهش یابد)

ملاحظات قبل از تجویز دارو

واکسیناسیون فقط در گاوهای سالم انجام شود.

تجهیزات استریل برای واکسیناسیون استفاده شود.

واکسیناسیون بالا فاصله پس از باز کردن شیشه ها انجام شود.

توصیه می شود واکسیناسیون در دمای معتدل (بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد) انجام شود.

شیشه های واکسن قبل از تجویز، خوب تکان داده شود.

عوارض واکسن

مواردی از واکنش های آنافیلاکتیک انفرادی در حیوانات حساس ممکن است مشاهده شود، در این شرایط تجویز آبی نفرین یا داروهای مشابه توصیه می شود.

تجویز واکسن در حین آبستنی و شیرواری

تجویز واکسن در تمام مراحل آبستنی و شیرواری بلامانع است.

دوره پرهیز

دوره پرهیز شیر و گوشت وجود ندارد.

احتیاط های ضروری

در صورت تزریق تصادفی به فرد واکسیناتور، به سرعت با در دست داشتن بروشور واکسن به مراکز درمانی مراجعه شود.

توصیه های ضروری در مورد نگهداری واکسن

واکسن در محل تاریک بین دمای ۲ الی ۸ درجه نگهداری شود. از بخ زدگی واکسن محافظت شود.

شرکت سازنده: شرکت هپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: کیمیا نور کالا

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

