

Nobivac® KC

واکسن داخیل بینی سگ Kennel Cough



شروع ایمنی به ترتیب از ۷۲ ساعت و ۳ هفته بعد برای
Canine Parainfluenza و B. bronchiseptica

تنها واکسن داخیل بینی محافظت کننده در برابر

با دوره ایمنی یک ساله Kennel Cough

قابل استفاده در توله سگ ها از دو هفتگی

قابل استفاده در دوران آبستنی

-
-
-
-



Nobivac® KC

تراكيب واكسن: هر دز واكسن حاوي باكتري Bordetella bronchiseptica سويه B-C2 با CFU $10^{9.7}$ - 10^{10} و ويروس Canine Parainfluenza سويه Cornell با TCID₅₀ $10^{5.8}$ - $10^{3.0}$ مي باشد.

شكل و نوع واكسن: واكسن ليوفيليزه زنده تخفيف حدت يافته مورد مصرف: واكسن داخل بيني جهت ايمن سازی فعال عليه بيماري تنفسی عفونی ناشی از باكتري B. Bronchiseptica و ويروس parainfluenza در سگ ها

دز و نحوه مصرف :

ابتدا يك دز واكسن را با ۱ ويال حلال مخصوص Nobivac® KC (يا آب مقطر) به خوبی حل کرده و سپس کل محلول آماده شده (۰/۴ ميلي لیتر) را با سرنگ استریل ۱ ميلي لیتری کشیده، سر حیوان رو به بالا ثابت نگه داشته و سر سوزن سرنگ را جدا کرده، کل محلول (۰/۴ ميلي لیتری) را در يک سوراخ بیني سگ خالي کنيد. واكسن آماده شده را ظرف مدت ۱ ساعت مصرف نمایيد. توصیه می شود نوبت اول تجویز واكسن در سن ۲ هفتگی باشد. متعاقب مصرف اين واكسن طی ۷۲ ساعت ايمنی بر عليه B. bronchiseptica و ۳ هفته بعد بر عليه canine parainfluenza ایجاد می شود. مدت ايمنی ۱ سال می باشد بنابراین باید سالیانه تکرار شود.

توصیه ها و احتیاطات لازم:

- ❖ دقت کنيد واكسن از شبکه توزيع رسمي تهیه شده باشد.
- ❖ واكسن باید طبق نظر دامپزشک مصرف شود.
- ❖ با هیچ گونه واكسن زنده و يا محصولات ایمونولوژیکی مخلوط نگردد.
- ❖ دور از دسترس کودکان، حیوانات و افراد بی اطلاع نگهداری شود.
- ❖ در صورت ورود اشتباه سرنگ به فرد تزریق کننده سریعا محل را با آب شست و شو داده و در صورت بروز علائم خاص به پزشک مراجعه شود.

موارد منع مصرف: از واکسیناسیون سگ های بیمار خودداری شود. به هیچ عنوان همزمان با سایر درمان های داخل بینی يا در طول درمان آنتی بیوتیکی استفاده نگردد.

عوارض جانبی: در توله سگ های خیلی جوان، ترشحات خفیف چشم و بینی ممکن است يك روز پس از واکسیناسیون رخ دهد. گاهی اوقات این ترشحات همراه با عطسه و سرفه هستند. علائم معمولاً گذرا بوده اما به ندرت تا ۴ هفته ادامه پیدا می کنند. در حیواناتی که علائم شدیدتری دارند ممکن است نیاز به درمان آنتی بیوتیکی باشد.

اطلاعات بیشتر: حیوانات واکسینه شده به مدت ۶ هفته بعد از واکسیناسیون، سويه واکسینال B. bronchiseptica و به مدت چند روز بعد از واکسیناسیون، سويه واکسینال canine parainfluenza را در محیط پخش می کنند. بنابراین حیوانات واکسینه به مدت ۶ هفته در مجاورت حیواناتی که نقص ايمنی دارند نگهداری نشوند.

شرایط نگهداری: واكسن و حلال Nobivac® KC در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتي گراد و دور از نور حمل و نگهداری شود. قبل از استفاده حلال واكسن باید به دمای محیط برسد.

مدت نگهداری:

- عمر قفسه اي: ۲۷ ماه
 - زمان مناسب مصرف پس از آماده سازی واكسن: ۱ ساعت
- بسته بندی: بسته بندی بصورت ويال تک دزی ۵ یا ۲۵ عددی همراه با حلال مخصوص واكسن Nobivac® KC محصول شركت MSD هلند می باشد.

شركه ثبت و وارد کننده انحصاری: نيكو ژن آريا



شركه پخش سراسری نيكان پخش

نيکان پخش به آفرين