



Nobivac® L4

واکسن چهارگانه لپتوسپیرا

- تهیه شده با بالاترین کیفیت و تکنولوژی برتر دنیا
- ایجاد ایمنی به مدت یک سال پس از تجویز واکسن
- شروع ایمنی ۳ هفته بعد از تزریق
- قابل استفاده در دوران آبستنتی
- ایمنی زایی فعال در سگ ها برای کاهش عفونت و دفع ادراری ارگانیسم



Veterinary
Medicines
Directorate



Nobivac® L4 واکسن چهارگانه لپتوسپیرا

ترکیب واکسن: هر دز واکسن علیه بیماری لپتوسپیروز حاوی:

- L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-ver (strain Ca-12-000) 3550–7100 U¹
- L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) 290–1000 U¹
- L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) 500–1700 U¹
- L. kirschneri serogroup Grippotyphosa serovar Dadas (strain Gr-01-005) 650–1300 U¹

¹. بر اساس آنتیژن الایزا

شكل و نوع واکسن: واکسن تزریقی کشته.

مورد مصرف: واکسن کشته Nobivac® L4 جهت ایمن‌سازی فعال علیه بیماری لپتوسپیروز ناشی از (L. Dadas L. Bratislava L. Copenhageni L. Canicola) در سگ‌ها می‌باشد. این واکسن علاوه بر کاهش عفونت، منجر به کاهش دفع ادراری باکتری در حیوانات مبتلا می‌شود.

دز و نحوه مصرف:

یک ویال واکسن (۱ میلی‌لیتر) Nobivac® L4 به صورت زیرجلدی تزریق شود. اولین دز تزریق واکسن در ۹–۶ هفتگی و تزریق دوم در ۱۰–۱۳ هفتگی توصیه می‌شود. تجویز واکسیناسیون یادآور سالانه می‌باشد. در صورت استفاده همزمان، یک دز واکسن Nobivac® DHPPi شامل canine adenovirus type 2, canine distemper virus, canine parvovirus و Nobivac® L4 مخلوط نمایید و قبل از استفاده اجازه دهید به دمای محیط (۲۵–۳۵ درجه سانتی‌گراد) برسد، سپس به صورت زیرجلدی تزریق گردد.

توصیه‌ها و احتیاطات لازم:

- دقت کنید واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.
- واکسن باید طبق نظر دامپزشک و فقط در حیوان سالم، پس از انجام معاینات لازم تجویز شود.
- با هیچ گونه واکسن زنده و یا محصولات ایمونولوژیکی مخلوط نگردد.
- دور از دسترس کودکان، حیوانات و افراد بی‌اطلاع نگهداری شود.
- از ورود اشتباه سرنگ به فرد تزریق کننده یا تماس با چشم خودداری شود؛ در صورت تحریک چشم فوراً به پزشک مراجعه کنید و بروشور یا برچسب آن را به پزشک نشان دهید.

موارد متع مصرف: از واکسیناسیون سگ‌های بیمار خودداری شود.

عارضات جانبی:

ممکن است یک تورم جزئی و موقت در محل تزریق چند روز پس از واکسیناسیون رخ دهد که در لمس سفت و دردناک است. این تورم روز پس از واکسیناسیون کم و یا ناپدید می‌شود. ممکن است افزایش ملایم دمای بدن و همچنین بهندرت در توله‌سگ‌ها کاهش فعالیت و اشتها پس از واکسیناسیون رخ دهد.

تداخل با سایر واکسن‌ها: واکسن‌ها Nobivac® L4 می‌تواند مخلوط با سایر واکسن‌های Nobivac® DHP و Nobivac® DHPPI به صورت زیرجلدی تزریق شود. وقتی با این واکسن‌ها به صورت مخلوط استفاده شود، از نظر کارایی و ایمنی تفاوتی با Nobivac® L4 به تنها یابی ندارد. هیچ اطلاعاتی در مورد ایمنی و اثربخشی این واکسن در استفاده با سایر محصولات دامپزشکی به جز محصولات ذکر شده در بالا در دسترس نیست.

شرایط و مدت نگهداری: ۱۲ ماه، در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد و دور از نور، حمل و نگهداری شود.

بسته‌بندی: بسته‌بندی به صورت ویال‌های تک دزی واکسن Nobivac® L4 در بسته‌های ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ عددی توسط شرکت MSD هلند تولید می‌گردد.

شرکت ثبت و وارد کننده انحصاری: نیکو ژن آریا

