


Nobivac® Puppy DP

واکسن دوگانه مخصوص توله سگ



تهیه شده با بالاترین کیفیت و تکنولوژی برتر دنیا
ایجاد ایمنی اولیه و سریع در برابر بیماری
canine parvovirus, canine distemper virus

کاهش ریسک ابتلا به بیماری در سنین پایین و در نتیجه ایمنی بالاتر
در تعاملات اجتماعی اولیه با سگ های دیگر
شروع ایمنی یک هفته پس از تجویز واکسن



Nobivac® Puppy DP

ترکیب واکسن: هر دز واکسن حاوی ویروس عامل بیماری canine distemper سویه Ondersteopor می باشد.

ویروس عامل بیماری canine parvovirus سویه 154 با حداقل 10^7 TCID₅₀ می باشد.

شكل و نوع واکسن: واکسن تزریقی لیوفیلیزه زنده تخفیف حدت یافته

مورد مصرف: واکسن دوگانه جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری canine parvovirus و canine distemper virus در توله سگ

دز و نحوه مصرف:

در ابتدا تک دز (ویال) واکسن با یک ویال (1 میلی لیتر) حلال Nobivac آماده شده و بصورت زیرپوستی تزریق شود. پس از آماده سازی واکسن طی مدت ۳۰ دقیقه مصرف شود.

واکسن Nobivac® Puppy DP برای استفاده در حیوانات با سطح بالای آنتی بادی (MDA) علیه canine distemper و یا canine parvovirus استفاده می شود. کمترین سن که تداخلی با واکسیناسیون ندارد در اغلب حیوانات ۶ هفتگی می باشد. برای اطمینان از محافظت توله سگ ها که در سن ۶ هفتگی واکسینه شده اند و به دلیل سطح بالای MDA امکان عدم پاسخ ایمنی مناسب وجود دارد و برای ایجاد محافظت در برابر canine infectious hepatitis (ناشی از آدنوویروس نوع ۱ سگ) و بیماری تنفسی ناشی از ویروس Nobivac DHPPi، واکسیناسیون مجدد با canine adenovirus type 2 و/or canine parainfluenza یا DHP موصیه شود.

برنامه واکسیناسیون پیشنهادی:

(۱) توله سگ هایی که در معرض دیستمپر و یا پاروویروس تا قبل از سن ۸ تا ۱۰ هفتگی هستند، و سطح آنتی بادی مادر

مشخص نیست:

• Nobivac Puppy DP - ۴ تا ۶ هفتگی

• Nobivac L4 Nobivac Lepto Nobivac DHP با Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4

• ۱۲ هفتگی - Nobivac Lepto, Nobivac L4 همراه با Nobivac DHPPi همراه با Nobivac DHP

(۲) توله سگ هایی که شروع واکسیناسیون از سن ۸ تا ۱۰ هفتگی است:

• Nobivac L4 Nobivac Lepto Nobivac DHP با Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4

• ۱۲ هفتگی - Nobivac Lepto, Nobivac L4 همراه با Nobivac DHPPi همراه با Nobivac DHP

موارد منع مصرف: از واکسیناسیون سگ های بیمار خودداری شود.

عوارض جانبی:

ممکن است به دنبال تزریق زیرپوستی، تورم جزئی و موقت تا ۵ میلی متر در محل تزریق مشاهده شود. گاهی اوقات تورم ممکن

است سخت و دردناک باشد و تا ۳ روز پس از تزریق ادامه یابد. در موارد نادر، ممکن است افزایش موقت دمای بدن رخ دهد.

همچنین واکشن از دیاد حساسیت به ندرت مشاهده می شود که بدون فوت وقت سریعاً آنتی هیستامین، کورتیکواستروئید یا آدرنالین

باید تجویز شود.

عمر قفسه ای: ۲۴ ماه، در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد و دور از نور، حمل و نگهداری شود. حلال Nobivac در دمای محیط نگهداری شود.

بسته بندی: بسته بندی بصورت ویال های تک دزی ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ عددی واکسن Nobivac® Puppy DP محصول شرکت MSD هلند می باشد.

شرکت ثبت و وارد کننده انحصاری: نیکو ژن آریا



شرکت پخش سراسری نیکان پخش

نیکان پخش به آفرین