



# TOXIPRA® PLUS

*A wise decision*

Inactivated vaccine against Enterotoxaemia, Tetanus and Blackleg

واکسن کشته علیه بیماری انتروتوكسیسمی، کزار و شارین علامتی



The Reference  
in Prevention  
for Animal Health



**توزيع انحصاری**  
تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به  
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱  
واحد ۶۷۱۳۱۶۷۱۴۱  
تلفن: ۰۲۶۶۵۲۵۴ - ۰۲۶۶۱۸۴۶ - ۰۲۶۶۵۹۱۸  
نامبر: ۰۲۶۶۵۹۲۰  
[www.parsianpakhsh.com](http://www.parsianpakhsh.com)

# TOXIPRA® PLUS

*A wise decision*




## انتخاب سادگی در تجویز




## برنامه واکسیناسیون

گوساله، بره، بزغاله شیر خوار



گوساله پرواری



گاو، گوسفند و بز بالغ ( برنامه سالیانه )




**TOXIPRA® PLUS.** Inactivated vaccine, Enterotoxaemia, Tetanus and Blackleg, in injectable suspension. COMPOSITION PER DOSE (2 ML): Sufficient amount of toxoids and anacuticals to obtain in control animals: *Clostridium chauvoei* 100% protection; *Clostridium perfringens* (types B, C and D) ≥ 10 IU of β-antitoxin/ml of serum and ≥ 5 IU of ε-antitoxin/ml of serum; *Clostridium novyi* type B ≥ 3.5 IU of α-antitoxin/ml of serum; *Clostridium septicum* ≥ 2.5 IU of α-antitoxin/ml of serum; *Clostridium tetani* ≥ 2.5 IU of antitoxin/ml of serum. Adjuvant. INDICATIONS: Adult Sheep and Goats: To prevent Enterotoxaemia (pulpy kidney disease), Necrotic hepatitis, Blackleg and Tetanus. Lambs and Kids: To prevent Diarrhoea, Haemorrhagic enteritis, Pulpy kidney disease, Blackleg and Tetanus. Cattle and Fattening calves: To prevent Enterotoxaemia, Black disease, Necrotic hepatitis, Blackleg and Tetanus. Suckling calves: To prevent Haemorrhagic enteritis, Enterotoxaemia and Tetanus. Swine: To prevent Necrotic enteritis, Enterotoxaemia (sudden death in sows) and Tetanus. Rabbits: To prevent Enterotoxaemia. SIDE EFFECTS: A sporadic anaphylactic reaction may appear in some sensitive animals. In such a case administer an antihistaminic. ADMINISTRATION ROUTE: Subcutaneous or intramuscular. In sheep and goats only vaccinate by subcutaneous route. It is advisable to administer the vaccine at a temperature between +15 and +25 °C. Shake before and during administration. DOSAGE: Sheep and Goats: 2 ml/adult animal; and 1 ml/young animal. Cattle: 4 ml/adult animal and fattening calf; and 2 ml/suckling calf. Swine: 2 ml/adult pig; and 1 ml/piglet. Rabbits: 0.5 ml/animal. Generally, the following vaccination programme is recommended: First vaccination: Vaccinate and revaccinate within an interval of 20 to 25 days. Booster vaccination: Administer one dose annually. Adult Sheep and Goats: In areas where pulpy kidney disease is very prevalent, it is advisable to vaccinate every 6 months (spring and autumn). Lambs and Kids: Vaccinate from a few days after birth. Fattening calves: Apply a preventive vaccination at the beginning of the fattening period. In herds where symptoms of enterotoxaemia appear, an emergency vaccination can be applied, revaccinating at 8 to 10 days. WITHDRAWAL PERIOD: 0 days. SPECIAL PRECAUTIONS: Store at +2 to +8 °C, avoiding freezing. PACKAGING: 100 ml bottle, 250 ml bottle. Registration N°: 10.505. Under veterinary prescription




## انتخاب بهترین نتیجه

انتقال آنتی بادی بر علیه توکسین بناز طریق ایمنی غیر فعال (آغوز) به بردها، موثر ترین راه در پیشگیری از آنترو توکسمی هموراژیک و اسهال خونی می باشد.

سطح آنتی بادی در میش های واکسینه شده توسط توکسی پراپلاس (۶و ۳ هفته پیش از زایش)



نرخ ایمنی غیر فعال کسب شده از طریق آغوز در برده های متولد شده از مادرهای واکسینه شده



Study code: EID-2006-086

## انتخاب بیشترین حفاظت

۱ بیماری های گوارشی



۲ بیماری های عصبی

۳ بیماری های جلدی

## انتخاب بالاترین ایمنی


بکارگیری ادجوانات موثر، قوی و بی ضرر، در عین ایمن بودن بهترین ایمنی را ایجاد می کند



The Reference  
in Prevention  
for Animal Health

## TOXIPRA PLUS

واکسن کشته علیه بیماری انترو توکسمی، کزار و شارین عالمتی



\*In accordance with European Pharmacopoeia standards

در گله هایی که عالم انترو توکسمی بروز می کند، واکسیناسیون اورژانسی در زمان تشخیص بیماری در گله و ۸-۱۰ روز بعد توصیه می باشد:

توکسینید بناز کلستریدیوم پرفرنزنس تیپ C, B, D و D<sup>(+)</sup> (≥ ۱۰ IU<sup>(+)</sup>)

توکسینید آلفا از کلستریدیوم پرفرنزنس تیپ B, C, D (≥ ۳/۵ IU<sup>(+)</sup>)

توکسینید آلفا از کلستریدیوم سپتیکوم (≥ ۲/۵ IU<sup>(+)</sup>)

توکسینید کشته شوای (محافظت صد درصد<sup>(+)</sup>)

واحدهای بین المللی آنتی توکسین در هر میلی لیتر از سرم\*

\*سطح محافظت در خوکچه هندي

قریب

هر دوز واکسن توکسی پراپلاس (۲ میلی لیتر) حاوی ترکیبات زیر

توکسینید بناز کلستریدیوم پرفرنزنس تیپ C, B, D و D<sup>(+)</sup> (≥ ۵ IU<sup>(+)</sup>)

توکسینید آلفا از کلستریدیوم نوای تیپ B (≥ ۳/۵ IU<sup>(+)</sup>)

توکسینید آلفا از کلستریدیوم تان (≥ ۲/۵ IU<sup>(+)</sup>)

و احتیاط های ضروري

واکسیناسیون تنها در دام های سالم توصیه می شود.

در صورت تزریق تصادفی به فرد واکسیناتور، به سرعت فرد واکسیناتور با در دست داشتن مشخصات دارو به مرکز درمانی منتقل شود.

تجویز واکسن در بزهای آبستن در هفته انتهای آستنی به علت احتمال سقط ناشی از استرس های وارد و توصیه نمی شود.

تجویز واکسن تا دو برابر دوز توصیه شده باعث بروز علائم و اثرات جانبی در حیوان نمی شود.

از مخلوط کردن این واکسن با دیگر ترکیبات دارویی پرهیز شود.

بطری، سرنگ ها و سر سوزن های استفاده شده در زیاله های مخصوص املاع شده و از ریختن آنها در خرگوش های پرواری و بالغ شود.

گاو و گوساله های پرواری: ۴ میلی لیتر به ازاء هر راس

گوساله های شیرخوار: ۲ میلی لیتر به ازاء هر راس

گوسفند و بز: ۲ میلی لیتر به ازاء هر راس

بره و بزغاله ها: ۱ میلی لیتر به ازاء هر راس

خرگوش های بالغ: ۰/۵ میلی لیتر به ازاء هر راس

این و اکسن به صورت داخل عضلانی یا زیر چربی قابل تزریق است. در شخوار کنده کان کوچک (گوسفند و بز) واکسیناسیون فقط از راه زیر چربی انجام می شود.

واکسیناسیون در تمام گونه های حیوانی یک هفته بعد از تولید قابل انجام است.

قبل از تجویز شیشه های واکسن به خوبی تکان داده شود.

واکسیناسیون بهتر است در دمای ۱۵-۲۵ درجه سانتی گراد انجام شود.

برنامه واکسیناسیون

واکسیناسیون اول: تجویز دو دوز واکسن با فاصله ۲۰-۲۵ روز، اولین واکسن یک هفته بعد از تولید تزریق می شود.

تجویز واکسیناسیون (واکسن یاداور): واکسن به صورت سالیانه تکرار می شود.

در مناطقی که بیماری قلوه نرمی شیوع بالائی دارد توصیه می شود.

که گوسفندها هر شش ماه یکبار واکسینه شوند و واکسن در پاییز و بهار تزریق شود.

در گوساله های پرواری توصیه می شود که یک دوز واکسن در ابتدای پرواریندی تجویز شود.



شرکت سازنده: هیرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: سور فجر

پارسیان پخش اکسیر

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری

